

Here is a list of diseases your baby will be protected against.

1. HepB: Hepatitis B, a serious liver disease  
\*It is permissible to administer 4 doses of HepB when combination vaccines are administered after the birth dose.
2. Polio: Polio, a serious paralyzing disease
3. Rotavirus: A virus that causes severe diarrhea  
\*If Rotarix® is administered at ages 2 and 4 months, a dose at 6 months is not indicated.
4. DTaP: Diphtheria, Tetanus (lockjaw) and Pertussis (whooping cough)  
\*DTaP may be given as early as 12 months if it has been 6 months since the previous dose and if the child might not return by 18 months of age.
5. PCV: Pneumococcal conjugate vaccine protects against a serious blood, lung, and brain infection
6. Hib: Haemophilus influenzae type b, a serious brain, throat, and blood infection
7. Influenza: A serious lung infection
8. Varicella: Also called chickenpox
9. MMR: Measles, Mumps, and Rubella
10. HepA: Hepatitis A, a serious liver disease  
\*All children age 12-23 months should receive 2 doses of Hepatitis A vaccine administered at least 6 months apart.

Pennsylvania's Timely Immunization Schedule is compatible with the recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) of the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), the American Academy of Pediatrics, and the American Academy of Family Physicians.



**Pennsylvania Immunization Coalition**  
[www.immunizepa.org](http://www.immunizepa.org)

Aquí está una lista de las vacunas y las enfermedades que pueden prevenir.

1. HepB: Hepatitis B, una enfermedad seria del hígado  
\*Los bebés que han recibido la vacuna al nacimiento seguida por vacunas combinadas con HepB pueden recibir hasta 4 dosis.
2. Polio: Una enfermedad grave que causa parálisis
3. Rotavirus: Un virus que causa diarrea grave  
\*Si se administra la vacuna Rotarix® a los 2 y 4 meses de edad, no se recomienda una dosis a los 6 meses.
4. DTaP: Difteria, Tétanos, y Tos Ferina  
\*La vacuna DTaP puede darse lo más temprano como a los 12 meses de edad si 6 meses han pasado desde la dosis previa y si es posible que el niño no regrese a los 18 meses de edad.
5. PCV: La vacuna neumocócica conjugada protege contra una infección de la sangre, los pulmones, y el cerebro
6. Hib: Haemophilus influenzae tipo b—una infección seria del cerebro, la garganta, y la sangre
7. Influenza: También conocida como la gripe—una enfermedad que puede causar infección seria de los pulmones
8. Varicela: Protección contra varicela
9. MMR: Sarampión, Paperas, y Rubéola (Sarampión alemán)
10. HepA: Hepatitis A, una enfermedad seria del hígado  
\*Todos los niños de 12 a 23 meses deben recibir 2 dosis de la vacuna de HepA esperando por lo menos 6 meses entre una y otra dosis.

Calendario de Vacunas de Pennsylvania Este calendario es compatible con las recomendaciones del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC), la Academia Americana de Pediatría y la Academia Americana de Médicos de Familia.